

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento CE 1305/2013 PSR
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV Novembre 44 -15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE
N° 5 DEL 09 GIUGNO 2021

FASE FENOLOGICA : INIZIO FIORITURA (BBCH 61)

ANDAMENTO CLIMATICO

ANCORA PERDURANTE INSTABILITA' ATMOSFERICA CON FENOMENI TEMPORALESCHI PREVISTI PER VENERDI' 11 GIUGNO. SI REGISTRANO AL MOMENTO SPORADICI SINTOMI VISIBILI SU FOGLIA E GRAPPOLO (NON SPORULATI). SI CONSIGLIA PERTANTO DI :

PERONOSPORA

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN PRODOTTO A BASE DI: PHOSETIL DI ALLUMINIO ASSOCIATO AD UN PRODOTTO DI COPERTURA O ALTRO PRODOTTO CON AZIONE ANALOGA. ADOPERARE COMUNQUE UN PRODOTTO SISTEMICO AL FINE DI EVITARE UN POSSIBILE DILAVAMENTO E MANTENERE PERTANTO LA PROTEZIONE FINO AL PERIODO DI FINE FIORITURA. SI RACCOMANDA LA CORRETTA ED ACCURATA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO.

OIDIO

LA FASE FENOLOGICA RAGGIUNTA E' MOLTO SENSIBILE ALL'INFEZIONE OIDICA. SI CONSIGLIA, PERTANTO, IN ABBINAMENTO AL TRATTAMENTO DI CUI SOPRA, UNO ZOLFO BAGNABILE COLLOIDALE ALLE MASSIME DOSI IN ETICHETTA CON IN MISCELA UN PRODOTTO AD AZIONE SISTEMICA E/O TRASLAMINARE.(SPIROXAMINA, TRIFLOXYSTROBIN, ECC)

ATTENZIONE: NON EFFETTUARE ALCUN TRATTAMENTO INSETTICIDA DURANTE LA FASE DI FIORITURA, PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI.

Attenersi in maniera scrupolosa alle indicazioni in etichetta, e per l'agroambiente, alle limitazioni indicate nelle norme tecniche per le sostanze attive consentite e le loro limitazioni nel nr. di trattamenti e la quantità'.

Si ricorda che dopo un trattamento in vigneto, per la salvaguardia della salute degli operatori, e' necessario attendere almeno 48 ore prima di svolgere operazioni colturali.

Chi fosse interessato a ricevere via e-mail il presente bollettino, comunichi il proprio indirizzo di posta ai seguenti soggetti:

Coltivatori Diretti 0144/322546
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0144/322243