

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

*Applicazione Regolamento CE 1305/2013*

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Fase fenologica: INIZIO FIORITURA BBCH 61

Bollettino di difesa della vite n°5 del 29/05/2020

## PERONOSPORA

Molte zone sono interessate da un accelerato e difforme inizio di fioritura, dovuto all'innalzamento delle temperature minime. Viste la fase fenologica delicata e le ripetute bagnature fogliari, è necessario effettuare un trattamento di copertura, utilizzando prodotti a base;

**Rame Metallo** o **Mancozeb** (max 3 volte entro il 30/06) o **Metiram** (max 3 volte entro il 30/06) o **Ditianon** (max 3 volte entro il 30/06) o **Folpet** (max 3 volte)

Per chi avesse utilizzato nel precedente intervento prodotti a diverso meccanismo di azione, si consiglia di mantenere la copertura a scadenza, utilizzando prodotti

ad azione sistemica come: **Metalaxil-M** o **Benalaxil / Benalaxil-M** (Max 3 volte Tot) o **Dimetomorf** o **Iprovalicarb** o **Mandipropamid** (Max 3 tratt/Anno x gruppo) o **Oxathiapiprolin** (Max 2 volte) ecc...

**ATTENZIONE:** limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

## OIDIO

Aggiungere alla miscela **Zolfo bagnabile** colloidale alle dosi di etichetta o altro prodotto antioidico di copertura.

**IMPORTANTE: EFFETTUARE I TRATTAMENTI IN ASSENZA DI VENTO PER EVITARE INQUINAMENTO PUNTIFORME, PERDITE DI PRODOTTO E DELLA SUA EFFICIACIA**

**Comunicare al servizio tecnico se si notano sintomi di qualsiasi natura, su foglia o su grappolo.**

***Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.***

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.**

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 / 835083

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)

**VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI**